

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ

Регистрационный номер ЛС – 000906

Торговое название препарата: Аскорбиновая кислота с глюкозой.

Лекарственная форма:

Таблетки.

Состав препарата:

Активные компоненты:

аскорбиновой кислоты - 100 мг, глюкозы - 877 мг.

Вспомогательные вещества: тальк, кислота стеариновая, сахара-роза.

Описание: Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа:

Средство, регулирующее метаболические процессы, витаминный препарат.

Код АТХ: [A11GB].

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Аскорбиновая кислота (витамин С) не образуется в организме человека, а поступает только с пищей. При сбалансированном и полноценном питании человек не испытывает дефицит в витамине С.

Показания к применению

Профилактика и лечение гипо- и авитаминоза витамина С. При повышенной потребности организма в витамине С в период активного роста у детей, беременности, грудного вскармливания, при высоких физических и умственных нагрузках, переутомлении, стрессовых состояниях, в период выздоровления после длительных и тяжелых заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды.

С профилактической целью назначают:

Взрослым - по 50-100 мг/сут.; детям 25 мг/сут. В период беременности и лактации по 300 мг/сут. в течение 10-15 дней, затем по 100 мг/сут.

С лечебной целью назначают:

Взрослым - по 50-100 мг/сут 3-5 раз в день; детям по 50-100 мг 2-3 раза в день.

Сроки лечения зависят от характера и течения заболевания и рекомендуются врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

При приеме более 1 г в день возможны изжога, диарея, затрудненное мочеиспускание, окрашивание мочи в красный цвет, гемолиз (у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, железа.

Особые указания

В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией почек и артериальным давлением. При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе лечения необходимо регулярно контролировать функциональную способность поджелудочной железы. Лицам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы следует применять препарат с осторожностью.

Форма выпуска

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 40 таблеток в банку из стекломассы.

Каждую банку или 1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в банку из картона. Допускается текст инструкции по применению наносить на банку.

Допускается банки или контурные ячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению укладывать в ящики из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель

ОАО «Марбиофарм»,
424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. К. Маркса, 121,
тел.: (8362) 42-03-12, факс (8362) 45-00-00