

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ

Регистрационный номер: ЛСР-005262/07

Торговое название препарата: аскорбиновая кислота с глюкозой.

Лекарственная форма: таблетки.

Состав

1 таблетка содержит:

активные вещества:

аскорбиновая кислота - 0,1 г
декстрозы моногидрат - 0,877 г

вспомогательные вещества:

крахмал картофельный - 0,013 г
стеариновая кислота - 0,008 г
кальция стеарат - 0,002 г

Описание

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, с риской на одной стороне и маркировкой "R" или без нее - на другой.

Фармакологическая группа: витамин.

Код АТХ [A11GB]

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Аскорбиновая кислота (витамин С) не образуется в организме человека, а поступает только с пищей. При сбалансированном и полноценном питании человек не испытывает дефицит в витамине С.

Показания к применению

Профилактика гиповитаминоза С. Обеспечение повышенной потребности организма в витамине С в период роста, беременности, грудного вскармливания, при высоких физических и умственных нагрузках, переутомление, стрессовые состояния, в период выздоровления после длительных и тяжелых заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды.

Взрослым - 50-100 мг/сут; детям - 25 мг/сут.

В период беременности и лактации по 300 мг/сут в течение 10-15 дней, затем по 100 мг/сут.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

Симптомы: при длительном применении больших доз (более 1 г) – головная боль, повышение возбудимости ЦНС, бессонница, тошнота, рвота, диарея, гиперацидный гастрит, ulcerация слизистой оболочки ЖКТ, угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия), гипероксалурия, нефролитиаз (из кальция оксалата), повреждение гломерулярного аппарата почек, умеренная поллакиурия (при приеме дозы более 600 мг/сут).

Снижение проницаемости капилляров (возможно ухудшение трофики тканей, повышение АД, гиперкоагуляция, развитие микроангиопатий).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, железа.

Меры предосторожности

В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование глюкокортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией надпочечников и артериальным давлением. Лицам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы следует применять препарат с осторожностью.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги упаковочной.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги упаковочной.

По 2, 3 контурные ячейковые упаковки с таблетками с маркировкой "R" с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 20 контурных безъячейковых или контурных ячейковых упаковок с таблетками без маркировки "R" с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона.

Контурные безъячейковые или контурные ячейковые упаковки с таблетками без маркировки "R" с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО "Производственная фармацевтическая компания Обновление"
633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95 Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru

Претензии направлять по адресу:

630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80